



Portfolio Cítricos

Botanigard registro posible en Marzo 2021 y Majestik pendiente del MAPAMA

CITRICOS	DESARROLLO DE LAS YEMAS	DESARROLLO DE LAS HOJAS	DESARROLLO DE LOS BROTES	DESARROLLO DE LAS FLORES	DESARROLLO DE LAS FLORES	DESARROLLO DE LAS FLORES	FLORACIÓN	FLORACIÓN	FLORACIÓN	DESARROLLO DEL FRUTO	MADURACIÓN DEL FRUTO	MADURACIÓN DEL FRUTO
ESTADO FENOLÓGICO												
DESCRIPCIÓN	Comienzan a hincharse las yemas.	Las primeras hojas empiezan a separarse: las hojas emergiendo.	Empieza a crecer el brote: se hace visible su tallo.	Las flores se hacen visibles: están todavía cerradas (botón verde).	Los pétalos crecen; los sépalos envuelven la mitad de la corola.	La mayoría de las flores, con pétalos cerrados, forman una bola.	Plena floración: alrededor del 50% de las flores están abiertas.	Las flores se marchitan: la mayoría de pétalos están cayendo.	Fin de floración: han caído todos los pétalos.	El fruto, verde, está rodeado por los sépalos a modo de corona.	El fruto empieza a colorear (cambio de color).	Fruto maduro y apto para el consumo: tiene su sabor y firmeza.
BBCH	01	10	31	55	56	59	65	67	69	72	81	89
Periodo crítico												
MINADOR <i>Phyllocnistis citrella</i>		Mimic (Tebufenocida 24% SC) 60-75 mL/hL										
Periodo crítico												
MOSCA BLANCA <i>Aleurothrixus floccosus</i>							Mospilan (Acetamiprid 20% SP) 30-50 g/hl // Botanigard OD (Beauveria bassiana) 125 mL/hL					
Periodo crítico												
MOSCA FRUTA <i>Ceratitis capitata</i>											Trebon (Etofenprox 30% EC) 0,75 L/ha; Parcheo 0,6 L/ha	
Periodo crítico												
PRAYS <i>Pray citri</i>						Delfin (Bacilus thurigiensis Kurstaki 32% WG) 50-75 g/hL						
OBSERVACIONES	Botanigard registro posible en Marzo 2021 y Majestik pendiente del MAPAMA											

CITRICOS	DESARROLLO DE LAS YEMAS	DESARROLLO DE LAS HOJAS	DESARROLLO DE LOS BROTES	DESARROLLO DE LAS FLORES	DESARROLLO DE LAS FLORES	DESARROLLO DE LAS FLORES	FLORACIÓN	FLORACIÓN	FLORACIÓN	DESARROLLO DEL FRUTO	MADURACIÓN DEL FRUTO	MADURACIÓN DEL FRUTO
ESTADO FENOLOGICO												
DESCRIPCIÓN	Comienzan a hincharse las yemas.	Las primeras hojas empiezan a separarse: las hojas emergiendo.	Empieza a crecer el brote: se hace visible su tallo.	Las flores se hacen visibles: están todavía cerradas (botón verde).	Los pétalos crecen; los sépalos envuelven la mitad de la corola.	La mayoría de las flores, con pétalos cerrados, forman una bola.	Plena floración: alrededor del 50% de las flores están abiertas.	Las flores se marchitan: la mayoría de pétalos están cayendo.	Fin de floración: han caído todos los pétalos.	El fruto, verde, está rodeado por los sépalos a modo de corona.	El fruto empieza a colorear (cambio de color).	Fruto maduro y apto para el consumo: tiene su sabor y firmeza.
BBCH	01	10	31	55	56	59	65	67	69	72	81	89
Periodo crítico												
AGUADO/PODEDUMBRE CUELLO <i>Phytophthora spp.</i>											Kdos (Hidóxido cobre 35 WG) 150-200 g/hl	
Periodo crítico												
MANCHA FOLIAR <i>Mycosphaerella spp.</i>												
Periodo crítico												
ALTERNARIA <i>Alternaria alternata</i>												
Periodo crítico												
POSTCOSECHA <i>Penicillium digitatum, P. italicum, Rhizopus spp.</i>												
OBSERVACIONES	Kdos: Efecto sobre Alternaria											

Nutrientes / Carencias Cítricos

MANDARINO	DESARROLLO DE LAS YEMAS	DESARROLLO DE LAS HOJAS	DESARROLLO DE LOS BROTES	DESARROLLO DE LAS FLORES	DESARROLLO DE LAS FLORES	DESARROLLO DE LAS FLORES	FLORACIÓN	FLORACIÓN	FLORACIÓN	DESARROLLO DEL FRUTO	MADURACIÓN DEL FRUTO	MADURACIÓN DEL FRUTO
ESTADO FENOLÓGICO												
DESCRIPCIÓN	Comienzan a hincharse las yemas.	Las primeras hojas empiezan a separarse: las hojas emergiendo.	Empieza a crecer el brote: se hace visible su tallo.	Las flores se hacen visibles: están todavía cerradas (botón verde).	Los pétalos crecen; los sépalos envuelven la mitad de la corola.	La mayoría de las flores, con pétalos cerrados, forman una bola.	Plena floración: alrededor del 50% de las flores están abiertas.	Las flores se marchitan: la mayoría de pétalos están cayendo.	Fin de floración: han caído todos los pétalos.	El fruto, verde, está rodeado por los sépalos a modo de corona.	El fruto empieza a colorear (cambio de color).	Fruto maduro y apto para el consumo: tiene su sabor y firmeza.
BBCH	01	10	31	55	56	59	65	67	69	72	81	89
Periodo crítico												
Aportación inmediata y progresiva N (estimula crecimiento)/Carencias Zn, Mn Fe/Vigor y calidad flores			Cruzado Zn/Mn/Fe 150 g/hl + Certamin Premium 1 kg/ha									
Periodo crítico												
Aportación inmediata y progresiva N/Carencias Zn, Mn Fe/Cuajado fruto				Cruzado Zn/Mn/Fe 150 g/hl + Certamin 200 ml/hl /// N-Expert 100 kg/ha. Riego								
Periodo crítico												
Aportación inmediata y progresiva N/Mejora calidad, contenidos, tamaño, coloración										Certamin K 200 ml/hl		
Periodo crítico												
Carencias Fe. Aplicar en caso de necesidad. Dosis plena producción				Cruzado 7% Fe 25-90 (70%) g/árbol. Riego							Cruzado 7% Fe 25-90 (30%) g/árbol. Riego	

OBSERVACIONES

N-Expert no debe usarse con ácidos o con productos de bajo pH/Cruzado Zn,Mn,Fe no mezclar con productos cúpricos y productos que contengan microorganismos/Certamin y C. Premiun no mezclar con productos cúpricos/Certamin K no mezclar con productos cúpricos y con base de fosetil-Al y fosfitos (fosfonatos). Cruzado Fe 7% será utilizado en riego y en caso de necesidad, el resto de productos y mezclas se aplicará en pulverización foliar.



www.certiseurope.es